

## AGAPORNIS TARANTA

**Nome em Latim:** Agapornis Taranta.

**Sub-espécies :** Agapornis Taranta Taranta

**Origem:** Eritreia e Etiópia, podendo-se encontrar os mesmos a elevadas altitudes 1300 e os 3200 mt acima do nível do mar.

**Habitat natural:** Preferem regiões arborizadas.

**Tamanho e Peso:** 17cm e 60 - 65g.

**Reprodução em Cativeiro** além de difícil só faz uma postura anual



### SEXAGEM

Os machos têm a testa vermelha e geralmente apresentam as rémiges assim como as penas da parte inferior das asas em preto, ainda que alguns machos apresentem as mesmas em verde (pouco usual). As crias são semelhantes às fêmeas adultas, no entanto as crias machos podem ser reconhecidos pelas penas escuras por debaixo das asas, só por volta dos 3 meses é que adquirem a coloração vermelha na testa. Normalmente o macho é maior que a fêmea.

### MATURIDADE SEXUAL

Entre os 8 e 18 meses.

### COMPORTAMENTO

Aves tímidas mas tolerantes á presença do ser humano, no entanto as fêmeas são extremamente agressivas na defesa do ninho. Agrupam-se em pequenos bandos de 8 a 20 aves, juntando-se ocasionalmente alguns bandos na copa de algumas arvores quando se alimentam. Recolhem sempre ao mesmo local para pernoitar uma hora antes do por do sol. Emitem chamamentos repetidos principalmente durante os voos.

### ALIMENTAÇÃO

Sementes de girassol, cânhamo e aveia. Adoram figos frescos, bagas de zimbro, maçãs, peras e painço.

### REPRODUÇÃO EM CATIVEIRO

A sua reprodução em cativeiro é difícil sendo necessário uma humidade elevada. Crucial uma relação entre o casal, sendo normal só iniciarem a procriação com alguns anos 2 a 4 anos. Extremamente importante fornecer um bom complexo de vitaminas C. Não toleram muito o frio, pelo que deverá manter uma temperatura mínima de 15°.

Gaiolas espaçosas com pelo menos 2m3, sendo o ideal manter um casal por gaiola.

Ninho : Agapornis (se possível maior melhor 15x15x25)

Criação: Acasalam de Novembro a Fevereiro.

Postura: 3 - 6 ovos, fazendo apenas uma criação por ano, podendo surgir eventualmente uma segunda postura não sendo no entanto muito comum.

Incubação: 26-29 dias.

Crias : só adquirem plumagem definitiva por volta dos 9 meses, e só começam a voar com cerca de 2 meses.

### COLONIAS

Não são aconselháveis, dada a dificuldade na reprodução e a necessidade de conseguir um casal harmonioso a presença de outras aves pode provocar desequilíbrios.

### COMÉRCIO

Proibição de exportação da Etiópia assim como criação baixa reprodutibilidade (1 criação por ano) tornam esta espécie extremamente rara de encontrar.

### MUTAÇÕES

Extremamente difícil encontrar mutações diferentes da cor verde (natural), no entanto existem algumas mutações como Factor escuro, Azul e Canela.

### OBSERVAÇÕES

É o maior de todos os agapornis.

Por *Manuel Falcão*

[forpus@mail.telepac.pt](mailto:forpus@mail.telepac.pt)